

Weiterführende Informationen zur Veranstaltung „Impfen - pro und contra“ am 12. November in Berlin

Veranstalter: GESUNDHEIT AKTIV in Kooperation mit
Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.

Impfempfehlungen der STIKO

Stand: Herbst 2014 (ohne Gewähr)

Impfungen	Alter in Monaten				Alter in Jahren		
	2	3	4	11-14	1	5-6	9-17
TD ¹⁾	1.	2.	3.	4.		A ³⁾	A ³⁾
Polio ¹⁾	1.	2.	3. ²⁾	4.			A
Keuchhusten	1.	2.	3.	4.		A	A
Hib	1.	2.	3. ²⁾	4.			
Hepatitis B	1.	2.	3. ²⁾	4.			G
Pneumokokke	1.	2.	3.	4.			
Rotaviren	1.	2. ⁶⁾	3.				
Meningokokke					1.	G	G
Masern, Mumps, Röteln, Windpocken				1.	2. ⁴⁾		G
HPV							2x ⁵⁾

G: Grundimmunisierung für alle Kinder und Jugendlichen, die bisher nicht geimpft wurden.

A: Auffrischungsimpfung.

1) Tetanus, Diphtherie, Polio: Abstände zwischen erster und zweiter sowie zweiter und dritter Impfung mindestens vier Wochen; Abstand zwischen dritter und vierter Impfung mindestens sechs Monate.

2) Entfällt bei Impfung mit einem Einzelimpfstoff.

3) Ab dem fünften Geburtstag wird ein Impfstoff mit reduziertem Diphtherietoxoid-Gehalt („d“) verwendet.

4) Zweite Impfung frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung.

5) Alle neun- bis vierzehnjährigen Mädchen (zwei Impfungen im Abstand von sechs Monaten zur Grundimmunisierung; ab 15 Jahren sind drei Impfungen notwendig).

6) Entfällt bei Impfstoff Rotarix.

Einzelimpfstoffe (Totimpfstoffe) mit niedrigem Aluminium-Gehalt

<i>Impfstoff</i>	<i>Tetanus</i>	<i>Diphtherie</i>	<i>Polio</i>	<i>Hib</i>	<i>Hepatitis B</i>	<i>Pneumokokken</i>	<i>Meningokokken C</i>
Tetanol pur	x						
Diphtherie-Impfstoff Behring (ab 5 J.)		x					
IPV Mérieux			x				
ACT-Hib				x			
HBVax PRO Engerix B					x		
Prevenar 13						x	
Meningitec							x

Kombinationsimpfstoffe für Säuglinge und Kleinkinder

<i>Impfstoff</i>	<i>Tetanus</i>	<i>Diphtherie</i>	<i>Polio</i>	<i>Keuchhusten</i>	<i>Hib</i>	<i>Hepatitis B</i>
Infanrix	x	x		x		
Tetravac	x	x	x	x		
Infanrix- IPV+Hib, Pentavac	x	x	x	x	x	
Hexyon, Infanrix Hexa	x	x	x	x	x	x

Kombinationsimpfstoffe mit Zulassung ab dritten bis sechsten Geburtstag (Totimpfstoffe) und niedrigem Aluminium-Gehalt

<i>Impfstoff</i>	<i>Tetanus</i>	<i>Diphtherie</i>	<i>Polio</i>	<i>Keuchhusten</i>
Td-rix (ab 5 Jahren)	x	x		
Revaxis (Auffrischung ab fünf Jahren)	x	x	x	
Covaxis (Auffrischung ab vier Jahren)	x	x		x
Repevax (Auffrischung ab drei Jahren)	x	x	x	x

Gehalt an Aluminium (Al³⁺) in Impfstoffen

ActHib, IPV-Mérieux, Nimenrix ¹⁾ , Menveo ¹⁾	0,0 mg
Prevenar 13 ²⁾	0,13 mg
Meningitec ³⁾	0,125 mg
Diphtherieimpfstoff Behring, Engerix B Kinder	0,25 mg
Tetravac, Pentavac, Td-rix ⁴⁾	0,3 mg
Covaxis, Repevax, Td Mérieux ⁴⁾ , Menjugate Kit ³⁾	0,33 mg
Revaxis	0,35 mg
Tetanol pur, Infanrix, Infanrix-IPV-Hib, Td-pur ⁴⁾ , Boostrix ⁵⁾ , Boostrix-Polio ⁶⁾ , NeisVac C ³⁾ , Bexsero ⁷⁾ , Synflorix ²⁾	0,5 mg
Hexyon	0,6 mg
Infanrix Hexa	0,8 mg
Tetanus-Impfstoff Mérieux	1,25 mg

- 1) Impfstoff gegen Meningokokken A,C,W135,Y
- 2) Impfstoff gegen Pneumokokken
- 3) Impfstoff gegen Meningokokken C
- 4) Impfstoff gegen Tetanus und Diphtherie ab 5 Jahren
- 5) Impfstoff gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten ab 4 Jahren
- 6) Impfstoff gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio ab 4 Jahren
- 7) Impfstoff gegen Meningokokken B